

D O R I A N A

Supplemento agli

LI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE "G. DORIA"

G E N O V A

Vol. V - N. 241

26 - III - 1981

ROBERTO POGGI

Museo Civico di Storia Naturale « G. Doria » - Genova

IL RINVENIMENTO IN GRECIA DI *BRYAXIS PORSENN*A
(REITTER)

(COL. PSELAPHIDAE)

L'amico Dr. Achille Casale, del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, mi ha donato tempo fa uno Pselafide da lui raccolto in Grecia durante una campagna di ricerche entomologiche.

L'esemplare riveste un particolare interesse perché appartiene ad una specie nuova per la Grecia: *Bryaxis porsenna* (Reitt.).


Descritta di Toscana (REITTER 1881), tale entità è relativamente comune in Italia e risulta segnalata del Canton Ticino e di varie regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata. Anche i colleghi pselafidologi Drr. C. BESUCHET (Ginevra) e G. CASTELLINI (Grosseto), da me interpellati in proposito, non conoscono altri reperti all'infuori di quelli sopra indicati.

La ben nota accuratezza del raccoglitore impedisce di pensare ad un errore di cartellinatura; il Dr. Casale ricorda inoltre perfettamente le modalità di raccolta dell'esemplare perché esso è stato l'unico Pselafide da lui rinvenuto in Grecia nel 1979; il reperto è dunque da considerarsi veritiero.

L'individuo in questione (un ♂) è stato raccolto nella Grecia nord-orientale, sul Monte Olympos, in Tessaglia, il 29.VII.1979, a 2450 m, « sotto una pietra interrata, nella zona dei pascoli alti, ... presso un nevaietto con *Duvalius meschniggi* Meixner, *Trechus thessalicus* Meixner

ed altro » (CASALE, in litt.) ed è stato da me depositato nelle collezioni del Museo Civico di Storia Naturale di Genova.

L'esemplare appartiene alla forma tipica della specie, quella con femori e tibie ingrossati; non ho riscontrato differenze morfologiche rispetto agli individui italiani; anche l'edeago è identico (cfr. figg. 1 e 2).



Edeagi di *Bryaxis porsenna* (Reitt.) di Italia: dint. di Genova, Gola dell'Alpesisa (fig. 1) e di Grecia: M. Olimpo (fig. 2).

È invece da sottolineare la rilevante altitudine alla quale è stato effettuato il reperto greco e che supera di oltre 1000 metri le massime quote cui giunge la specie in Italia: *Bryaxis porsenna* si rinviene infatti generalmente a basse e medie altitudini e preferibilmente in zone boschive.

La scoperta di quest'entità nel territorio ellenico è a mio parere sintomatica della necessità di svolgere ulteriori ed accurate ricerche

sulla fauna della Grecia settentrionale; in questo caso sembra infatti ben difficilmente sostenibile l'ipotesi di una più o meno recente diffusione per trasporto passivo.

La distribuzione che *Bryaxis porsenna* viene così ad assumere può ricordare, a grandi linee, quelle figurate da GRIDELLI 1950 per *Chrysolina lutea* (Petagna) e per *Dorcadion etruscum* (Rossi); tali entità sono state considerate da GRIDELLI (l.c., p. 35) come paleoappenniniche a diffusione transionica.

BIBLIOGRAFIA

- GRIDELLI E., 1950 - Il problema delle specie a diffusione transadriatica con particolare riguardo ai Coleotteri. - *Mem. Biogeogr. adr.*, Venezia, **1**: 1-299, 52 figg.
- REITTER E., 1881 - Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. V. Paussidae, Clavigeridae, Pselaphidae und Scydmaenidae. - *Verh. k. k. zool. - bot. Ges. Wien*, **31**: 443-592, tav. XIX.

RIASSUNTO

L'Autore riferisce sulla presenza in Grecia (M. Olimpo) di *Bryaxis porsenna* (Reitter), specie sino ad oggi nota solo per la penisola italiana.

SUMMARY

Bryaxis porsenna (Reitter), formerly known only for the Italian peninsula, is also recorded for Greece (Mt. Olympus).

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Εἰς τὴν παρουσίαν εἰς τὴν Ἑλλάδα (Ὄρος Ὀλυμπος) τοῦ εἴδους *Bryaxis porsenna* (Reitter), ἕως σήμερα γνωστοῦ μόνον διὰ τὴν Ἰταλικὴν χερσόνησον.